

Immunothérapie orale (ITO)

Clinique d'immunothérapie orale (CITO) du CHU Sainte-Justine

Site Internet : <https://www.chusj.org/fr/soins-services/A/Allergie/CITO>

Critères de priorisation : <https://www.chusj.org/fr/soins-services/A/Allergie/CITO/Parents/Criteres>

Pour s'inscrire à la CITO (parent) : <https://www.chusj.org/fr/soins-services/A/Allergie/CITO/Parents/Inscription>

Clinique d'immunothérapie orale Enfant Soleil (CITO) du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Processus pour avoir accès au traitement :

Si votre enfant a une ou des allergies alimentaires et que vous êtes intéressés par le nouveau traitement de désensibilisation par immunothérapie orale, parlez-en à votre médecin de famille qui pourra remplir une requête pour une consultation en immunoallergie. Si votre enfant est déjà suivi par un immunoallergologue ou un autre médecin spécialiste, ce dernier peut faire une demande à la clinique en mentionnant l'intérêt pour le traitement de la CITO selon les procédures habituelles.

Division d'allergie et d'immunologie clinique de l'Hôpital de Montréal pour Enfants

La clinique d'allergies et d'immunologie de l'Hôpital de Montréal pour Enfants offre depuis 2012 la désensibilisation aux moins de 5 ans sur une base régulière sans liste d'attente, si l'historique de santé le permet. Pour les familles désirant une consultation dans le but de désensibiliser leur enfant, il est important que la référence du pédiatre mentionne **ITO** ou **OIT** ou **DÉSENSIBILISATION ALIMENTAIRE** ou **IMMUNO THÉRAPIE ORALE** afin que le jeune soit référé à un allergologue pratiquant l'ITO. Les demandes peuvent être faites au TCC 514-228-8888 ou envoyées par fax au 514-228-1197 ou par courriel au rendezvouschildren@muhc.mcgill.ca.

Pour toutes familles demeurant sans accès à l'ITO, voici la nouvelle adresse courriel où un membre de l'équipe d'ITO/OIT de l'Hôpital de Montréal pour enfants se fera un plaisir de répondre: oit@muhc.mcgill.ca.

Les nouvelles études d'ITO nommées **IMPROVES/SORT**, pour les 2-18 ans, ont débuté à l'été 2022. Elles consistent à comparer la désensibilisation à l'allergène soit l'arachide, les œufs ou le lait de vache à des doses minimales, doses normales et/ou débutant avec des aliments cuits. Le but étant toujours d'établir un protocole de désensibilisation des plus efficaces, mais aussi des plus sécuritaires (moins de risques d'anaphylaxies possibles). Aucun placebo ni groupe d'attente, tous les participants aux études d'ITO recevront la désensibilisation! P.S. Les critères d'inclusion sont un bon contrôle de l'asthme et aucun signe d'œsophagite à éosinophiles (EOE).